

漢方薬

ひ ゆう

オオクサ 鼻優S

特 徵

- オオクサ鼻優Sは漢方薬「葛根湯加川芎辛夷」(かっこんとうかせんきゅうしんい)の抽出エキスを飲みやすい糖衣錠にした漢方製剤です。
- 比較的体力がある方の慢性鼻炎、鼻づまり、蓄膿症に良く効きます。
- 眠くなりにくいので、仕事中や外出先でも安心して服用になれます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
 - (4) 胃腸の弱い人。
 - (5) 発汗傾向の著しい人。
 - (6) 高齢者。
 - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
 - (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
 - (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|----------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 吐き気、食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

比較的体力があるものの次の諸症：

鼻づまり、蓄膿症(副鼻腔炎),
慢性鼻炎



鼻づまり



慢性鼻炎

用法・用量

次の量を食前又は食間に、水またはお湯でかますに服用してください。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 成人(15歳以上) | 4錠 | 3回 |
| 7歳以上15歳未満 | 3錠 | |
| 5歳以上7歳未満 | 2錠 | |
| 5歳未満 | 服用しないでください | |

<用法・用量に関する注意>

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

12錠(成人の1日服用量)中、次の成分及び分量からなる葛根湯加川芎辛夷水製エキス3250mgを含んでいます。

| 成 分 | 分 量 | 成 分 | 分 量 |
|-----------|------|------------|------|
| カッコン(葛根) | 2.0g | ショウキョウ(生姜) | 0.5g |
| マオウ(麻黄) | 2.0g | カンゾウ(甘草) | 1.0g |
| ケイヒ(桂皮) | 1.0g | センキュウ(川芎) | 1.5g |
| シャクヤク(芍薬) | 1.0g | シンイ(辛夷) | 1.5g |
| タイソウ(大棗) | 1.5g | | |

添加物として乳糖、ゼラチン、炭酸Ca、タルク、無水ケイ酸、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、セラック、アラビアゴム、酸化チタン、ヒマシ油、白糖、カルナウバロウを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。



包 裝 300錠

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

大草薬品株式会社 「お客様相談係」

電話：046-834-1193 [月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)]

発売元

大草薬品販売株式会社

神奈川県横須賀市森崎1-17-15

製造販売元

大草薬品株式会社

神奈川県横須賀市森崎1-17-15