

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

第2類
医薬品

循環器用薬

しょう せき なん せい じょう
石川松石南の精錠

特 徴

○石川松石南の精錠はのぼせ、肩こり、頭重など高血圧の諸症状に効果のある薬です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
軟便、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効 能

高血圧の随伴症状（のぼせ、肩こり、耳なり、頭重、不眠、不安）の緩和



肩こり



頭重

用法・用量

次のいずれかの方法で、水又は温湯にてかまずに服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数	服用時間
成人(15歳以上)	8錠	3回	毎食前(30~60分)
	6錠	4回	毎食前(30~60分) 及び就寝前
15歳未満	服用しないでください		

<用法・用量に関連する注意>

(1) 用法・用量を厳守してください。

成分・分量


24錠(成人の1日服用量)中

成分	含量	成分	含量
松葉末	2.0g	日局ウウルシ	0.5g
日局ダイオウ末	0.7g	日局キササゲ	0.5g
日局オウゴン末	0.7g	日局モクツウ	0.2g
日局オウレン末	0.5g	海藻末(昆布末)	0.2g

添加物としてカルボキシメチルセルロースナトリウム、タルク、パレISHOデンブンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。



包装 180g

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

大草薬品株式会社「お客様相談係」

電話：046-834-1193〔月～金曜日 9:00～17:00(祝日を除く)〕

製造販売元

大草薬品株式会社

神奈川県横須賀市森崎1-17-15